

# GÜZ ÇİĞDEMİ(Colchicum cilicicum)



<b><u>Bilesimi</u></b>	Tohumlar kolşisin, azotdezasetilkolhisin, 4-desmetilkolhisin, 3-dimetilazotmetilkolhisin alkaloidleri ihtiva eder; daha nötral karakterde maddeler: azotformildezasetilkolhisin; glikoalkaloid kolhikozid, tiokolşisin, apigenin flavonu, aromatik dizisinden asitler, fitosterin şekerler, % 17 kadar (olein, palmitin ve linol asitlerinden ibarettir.) yağlı maddeler, nişasta vs. ihtiva eder. Yumru soğancıklar; kolşisin, yağlı maddeler, reçine vs. ihtiva eder.
<b><u>Kullanılan Kısmı</u></b>	Tohumlar kullanılır. Meyve kapsülleri olgunlaşmadan az evvel (Haziran-Temmuz aylarında) toplanır.
<b><u>Yetiştigi Yer/bölge</u></b>	Çayırlar, ovalar, meralar ve çalılık arasında ve memleketin her tarafında bulunur.
<b><u>Kullanılışı</u></b>	Kolşisin ve kolhamin alkaloidleri hücrelerin ayrılmasına mani olur. Kan verici organ dokularını değiştirir, bundan dolayı akyuvar hücrelerde azalma meydana gelir. Bitkinin bütünü idrar söktürücü ve çok zayıflatıcıdır. Kronik leukoz ve deri kanseri tedavisinde kullanılır. Cilt kanseri tedavisi haricen kolhamin yağı şeklinde kullanılır. Bunun terkibine hialuronidaz fermenti ilave edilerek kullanılması tavsiye edilir. Deri kanserinin ilk devresinde çok iyi te'sir gösterdiği görülmüştür. Bitki bazı vakalarda, nikris (podagra) illetine, mafsallı romatizması, endokardit (kalbin iç zarı) ve perikardit

	(kalp dışı zannın iltihaplanması), skarlatinal nefrit vs. hastalıklara karşı kullanılır.
<b><u>Kullanma şekli</u></b>	Doktorun tavsiyesi üzerinedir.
<b><u>Halk Arasında Kullanılışı</u></b>	Su toplama, şişkinlikler, mafsalsomatizması vs. kullanılması tavsiye edilir. Haricen 1/10 nisbetinde kuvvetli alkol içerisinde tohumlar 20 gün bekletilirse romatizmalı yerler, nikris ve nevralsjide ağrılı yerleri yağlamakta kullanılır. Böbreklerde skarlatinoz iltihabı ve deri altı ödemlerde içilerek kullanılır.
<b><u>Fiziksel Özelliği</u></b>	İnce kahve rengi zarla sarılı, yumurta biçiminde yumru soğancıklı çok yıllık otsu bitkidir. Çiçekler güz mevsiminde gelişir. Çiçekler açık pembe veya erguvani pembe, bazen de beyaz renkte, 6 bölümlü, kenar yapraklarda 6 bölümlü, uzun soluk borucuğun kaidesine kaynaşmış yapraklar ilkbaharda inkişaf eder, sulu, koyu yeşil ve geniş mızrak biçimindedir. Yapraklarla birlikte meyvede gelişir. Meyve yaz mevsiminde olgunlaşır, evvela yeşil, sonraları kahve rengini alır. Üç evli, çok sayıda siyah kahve tohumları küre şeklinde ve acı tattadır. Eylül-Ekim aylarında çiçek açar.
<b><u>UYARI</u></b>	<b>BİTKİ İNSAN VE HAYVAN ORGANİZMALARINDA ZEHİR ETKİLİDİR! DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANINIZ.</b>